

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ..... 210
วันที่..... 14 ต.ค. 2566
เวลา..... 09.41 น.
ที่ ชย ๐๔๑๘/จ ๔๑๑



องค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส
เลขที่..... 355
วันที่..... 9 ต.ค. 2566
เลข..... 13.48 น.

ที่ว่าการอำเภอจตุรัส
ถนนโกสีย์ ชย ๓๖๑๓๐

พ. กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย ๐๐๑๗.๒/ว ๒๗๓
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

พร้อมนี้อำเภอจตุรัส ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย ๐๐๑๗.๒/ว ๒๗๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลด QR Code ทำหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

เรียน อบต.ลุดน้ำใส

ขอแสดงความนับถือ

☐ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

☒ เพื่อดำเนินการ

ทราบและดำเนินการ

☐ แจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายรัตนภูมิพันธ์ ชะม้ายกลาง)

ปลัดอำเภอ รักษาการแทน

นายอำเภอจตุรัส

(นางสุจิตรา บานจำรูญ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส

(นางผกามาศ ชาติชนะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางกองสาธารณสุข

(นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส



ที่ทำการปกครองอำเภอ

สำนักงานอำเภอ

โทร./โทรสาร. ๐ ๔๔๘๕๑๐๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส

- กองสาธารณสุข

(นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ)

รองปลัด อบต.ลุดน้ำใส รักษาการแทน

ปลัด อบต.ลุดน้ำใส

(นางปรีชา โพธิ์ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส

13 ต.ค. ๖๖



ชย ๐๐๑๗.๒/ว.๒๗๗

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ชย ๓๖๐๐๐

ทอ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๒๑๑.๓/ว.๔๙๙
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขขอความอนุเคราะห์ให้เผยแพร่
สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ เนื่องจากอัตราการเข้ารับการฉีดวัคซีนที่มีความจำเป็นตามแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนกลับมาระบาดใหญ่ได้อีกครั้ง
กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานดังกล่าว
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีในพื้นที่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานและอำเภอ เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวง
สาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีในพื้นที่ โดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ประสานติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ดำเนินการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ไตรศักดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ



สื่อประชาสัมพันธ์

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๕๗๓


บัญชีหัวหน้าส่วนราชการ

แนบท้ายหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๑๗.๒/ว


ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖

-
๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
 ๒. ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
 ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
 ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
 ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
 ๖. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 ๗. นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
 ๘. นายอำเภอ ทุกอำเภอ



ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๕๕๕



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๘
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า อัตราการเข้ารับบริการวัคซีน
ที่มีความจำเป็นตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
กลับมาเกิดการระบาดใหญ่ได้อีกครั้ง เช่น โรคหัด หัดเยอรมัน โปลิโอ คอตีบ ไอกรณ ทำให้เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีน
มีความเสี่ยงที่จะป่วยและมีอาการรุนแรง ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ ให้สามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง และครอบคลุมประชากร
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีในพื้นที่ เช่น
หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขปี ๒๕๖๖ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดการป่วยรุนแรง และป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง QR Code หรือทางเว็บไซต์
<https://shorturl.asia/i38ae>

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย




สื่อประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๕๕



อ.จ.จ.จ.

- นว.จ.จ.

(นายกัณฐกร คนรู้)
ผอ.ก.ย.ย.ย.

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว.ร.



กทอ.สธ.ส.ป.

เลขรับที่ 54

วันที่ 12 ม.ค. 66

1144

กระทรวงสาธารณสุข
กองกลาง สำนักเลขาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 12 ม.ค. 2566
เลขรับ 158c
เวลา 09.31 น.

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักนโยบายและแผน สป
ม.ภูมิคุ้มกันโรค
วันที่ 12 ม.ค. 2566
เลขรับที่ 384
เวลา 10.55 น.

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทย ได้จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชากรทุกคน เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากโควิด 19 โดยเร่งรัดและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึง แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่าอัตราการเข้ารับวัคซีนที่มีความจำเป็นตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อป้องกันได้ด้วยวัคซีนกลับมาเกิดการระบาดใหญ่ได้อีกครั้ง เช่น โรคหัด หัดเยอรมัน โปлио คอตีบ ไอกรณ ทำให้เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนมีความเสี่ยงที่จะป่วยและมีอาการรุนแรง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บริการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก สำหรับสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการสร้างความเชื่อมั่น และเชิญชวนให้เกิดการตระหนักรู้ของประชาชนและการพาบุตรหลานเข้ารับบริการวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคครบถ้วนตามเกณฑ์นำไปสู่การเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันของประชากรในประเทศไทย ให้เพียงพอต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนต่อไป นั้น

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขปี ๒๕๖๖ ให้สามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและความครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย เห็นควรขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. วิดีทัศน์เชิญชวนผู้ปกครองพาเด็ก มาฉีดวัคซีน

๒. โปสเตอร์กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขปี ๒๕๖๖ โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง QR Code ท้ายหนังสือ หรือทางเว็บไซต์ <https://shorturl.asia/38ae> เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขปี ๒๕๖๖ ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป ด้วย
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ สานิตย์)

รองเลขาธิการกระทรวงสาธารณสุข

ที่ปรึกษาเลขาธิการกระทรวงสาธารณสุข

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและป้องกันโรค

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๓๓๔๖ - ๗

โทรสาร -



สื่อประชาสัมพันธ์

กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566



กำหนดการให้วัคซีนในเด็ก

อายุ	วัคซีนที่ใส่	สิ่งแนะนำ
แรกเกิด	HB1 วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี	ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง หลังคลอด
	BCG วัคซีนป้องกันวัณโรค	ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล
1 เดือน	HB2 วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี	เฉพาะรายที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี
2 เดือน	DTP-HB-Hib1 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โสโครก ตับอักเสบบี-ฮิบ	ห้ามให้วัคซีนโรคคอตีบ 1 ในเด็กที่อายุมากกว่า 15 ปีแรก
	OPV1 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน	
	Rotar1 วัคซีนโรตา	
4 เดือน	DTP-HB-Hib2 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โสโครก ตับอักเสบบี-ฮิบ	ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด 1 เข็ม พร้อมวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน 1 ครั้ง
	OPV2 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน	ห้ามให้วัคซีนโรคคอตีบ 1 ในเด็กที่อายุมากกว่า 32 สัปดาห์
	IPV วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด	
	Rotar2 วัคซีนโรตา	
6 เดือน	DTP-HB-Hib3 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โสโครก ตับอักเสบบี-ฮิบ	ห้ามให้วัคซีนโรคคอตีบ 1 ในเด็กที่อายุมากกว่า 32 สัปดาห์
	OPV3 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน	ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน 3 เข็มที่อายุ 6 เดือน 18 เดือน และ 3 ปี
	Rotar3 วัคซีนโรตา	
9 เดือน	MMR1 วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน	
1 ปี	LAJE1 วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเอชชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	
1 ปี 6 เดือน	DTP4 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โสโครก	
	OPV4 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน	
	MMR2 วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน	
2 ปี 6 เดือน	LAJE2 วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเอชชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	
4 ปี	DTP5 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โสโครก	
	OPV5 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน	
ประถมศึกษาปีที่ 1	MMR วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน	ควรให้ก่อนเข้าเรียนให้วัคซีนเฉพาะรายที่ฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์
	HB วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี	
	LAJE วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเอชชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	
	IPV วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด	
	dT วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก	
	OPV วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน	
	BCG วัคซีนป้องกันวัณโรค	ให้ฉีดเมื่อมีพื้นที่ระบาดรุนแรงได้ดำเนินการฉีดแล้วไม่พบผลเป็น ให้ฉีดในเด็กที่สงสัยเชื้อวัณโรคหรือวัณโรค
ประถมศึกษาปีที่ 5 (นักเรียนหญิง)	HPV1 และ HPV2 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี	แนะนำนักเรียนหญิงระหว่าง 9-14 ปี - กรณีฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่ออายุ 9-14 ปี ให้ฉีดเข็มที่ 2 เมื่ออายุ 12-14 ปี - กรณีฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่ออายุ 15-17 ปี ให้ฉีดเข็มที่ 2 เมื่ออายุ 16-17 ปี
ประถมศึกษาปีที่ 6	dT วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก	

กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีนซ้ำ

ครั้งที่	ช่วงอายุ 1-6 ปี		สิ่งแนะนำให้ฉีด / ปีขึ้นไป		ข้อมูลอื่นๆ
	เดือนที่	วัคซีน	เดือนที่	วัคซีน	
1	0 (เมื่อพบเด็กครั้งแรก)	DTP-HB-Hib1 OPV1	0 (เมื่อพบเด็กครั้งแรก)	dT1 OPV1	ให้วัคซีน IPV เฉพาะรายที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ในเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี และฉีดครั้งเดียวเป็น 1 ปี
		IPV		IPV	
		MMR1		MMR	
		BCG		BCG	
- ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับวัคซีนจากวัคซีนชนิดนี้แล้วเป็นไปเพื่อป้องกันโรควัณโรคหรือวัณโรคดื้อยา					
2	1	DTP-HB-Hib2 OPV2 LAJE1	1	HB1 LAJE1	
3	2	MMR2	2	dT2 OPV2 HB2	
4	4	DTP-HB-Hib3 OPV3	7	HB3	
5	12	DTP4		dT3	
		OPV4 LAJE 2	12	OPV3 LAJE 2	

กำหนดการให้วัคซีนในผู้ใหญ่*

วัคซีน	กลุ่มเป้าหมาย	กำหนดการให้วัคซีน
dT	หญิงตั้งครรภ์	3 ครั้ง หรือตามประวัติการให้วัคซีน
	บุคคลอายุ 20, 30, 40 ปี (อายุลงด้วยเลข 0)	1 ครั้ง ทุก 10 ปี
Influenza	หญิงตั้งครรภ์ (ตามประวัติการให้วัคซีนครั้งถึงปี)	1 ครั้ง ทุกครั้งตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป)
	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ปีละ 1 ครั้ง
	เฉพาะช่วงระบาด ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีแรก 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค และผู้ที่มีภาวะอ้วน (BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5. โรคอ้วน (BMI > 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 6. โรคเบาหวาน (น้ำตาลกลูโคส > 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือ HbA1c > 6.5%) 7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้	ปีละ 1 ครั้ง
	นักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1	1 ครั้ง
	เฉพาะช่วงระบาด ผู้ใหญ่อายุ 20-40 ปี ได้แก่ 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน 2. บุคลากรทางการแพทย์ตำรวจ 3. ผู้ที่อาศัยและทำงานใกล้ชิดหรือร่วมการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 4. กลุ่มที่แสดงอาการในโรงงานและสถานประกอบการ 5. ประชาชนทั่วไป 6. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ แรงงานต่างด้าว ผู้ที่ปฏิบัติงานในชุมชน ผู้ป่วย เป็นต้น	1 ครั้ง
MR		
HB	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ปีละ 3 ครั้ง (0, 1, 6 เดือน) ในผู้ที่ไม่เคยฉีด 2536 ในผู้ที่เคยฉีด 1 ครั้ง ในผู้ที่เคยฉีด 2 ครั้ง

หมายเหตุ

1. วัคซีนทุกชนิด ให้นำไปฉีดตามกำหนดการให้วัคซีน
2. สำหรับวัคซีนที่ฉีดไปแล้วเกินกว่า 3 ครั้ง หากมีอาการแพ้วัคซีนหรือมีอาการแพ้ยา ควรแจ้งแพทย์ผู้ให้วัคซีนทราบ
3. กรณีแพ้วัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่งหรือแพ้ยา ให้ฉีดตามคำแนะนำของแพทย์
4. การบริหารการฉีดวัคซีน เป็นไปตามจำนวนวัคซีนที่ฉีดตามคำแนะนำ



ที่มา : แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

กำหนดการให้วัคซีน
ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2566



กองโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566

สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2562 ได้ส่งผลต่อการได้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเฉพาะในเด็กอายุ 0-5 ปี โดยในปี 2563 และ 2564 พบว่ามีแนวโน้มความครอบคลุมการได้รับวัคซีนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 และในปี 2565 การได้รับวัคซีนภาพรวมแต่ละชนิดส่วนใหญ่มีความครอบคลุมต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด หากความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำกว่าค่าเป้าหมายดังกล่าว อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในวงกว้างได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จึงควรเร่งรัดติดตามกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าวให้มารับบริการวัคซีนให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันของประชากรในประเทศไทย ในการลดการป่วยที่รุนแรงและที่เพียงพอต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนต่อไป

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีการบริการวัคซีนขั้นพื้นฐานตามช่วงอายุที่เหมาะสม เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคน ตามสิทธิประโยชน์พื้นฐานในบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งสำหรับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่ให้บริการมีวัคซีน 11 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (HB) วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTP-HB-Hib) วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) วัคซีนโรต้า (Rota) วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) วัคซีนป้องกันโรคไขสันหลังอักเสบเจ็ชชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (LAJE) วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี (HPV) และวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ซึ่งป้องกันทั้งหมด 13 โรค ได้แก่ โรคตับอักเสบบี วัณโรค โรคคอตีบ โรคบาดทะยัก โรคไอกรน โรคฮิบ โรคโปลิโอ โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคคางทูม โรคไขสันหลังอักเสบเจ็ช และมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี และกำหนดให้วัคซีนในผู้ใหญ่ ได้แก่ วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) และวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (HB)

กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 ประกอบด้วยอายุหรือกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับวัคซีน ชนิดของวัคซีนที่ให้ และข้อแนะนำ ดังตารางที่ 1-4 ดังนี้

ตารางที่ 1 กำหนดการให้วัคซีนในเด็กแรกเกิดถึงอายุ 4 ปี ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566

อายุ	วัคซีนที่ให้	ข้อแนะนำ
แรกเกิด	วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีครั้งที่ 1 (HB1)	ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด
	วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)	ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล
1 เดือน	วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีครั้งที่ 2 (HB2)	เฉพาะรายที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี
2 เดือน	วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ ครั้งที่ 1 (DTP-HB-Hib1)	ห้ามให้วัคซีนโรคใดครั้งที่ 1 ในเด็กที่อายุมากกว่า 15 สัปดาห์
	วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน ครั้งที่ 1 (OPV1)	
	วัคซีนโรคตาครั้งที่ 1 (Rota1)	
4 เดือน	วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ ครั้งที่ 2 (DTP-HB-Hib2)	- ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด 1 เข็ม พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน 1 ครั้ง - ห้ามให้วัคซีนโรคใดครั้งสุดท้าย ในเด็กที่อายุมากกว่า 32 สัปดาห์
	วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน ครั้งที่ 2 (OPV2)	
	วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV)	
	วัคซีนโรคตาครั้งที่ 2 (Rota2)	
6 เดือน	วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ ครั้งที่ 3 (DTP-HB-Hib3)	- ห้ามให้วัคซีนโรคใดครั้งสุดท้าย ในเด็กที่อายุมากกว่า 32 สัปดาห์ - ให้ยกเว้นการได้รับวัคซีนโรคตาครั้งที่ 3 ในเด็กที่ได้รับวัคซีน Rotarix มาแล้ว 2 ครั้ง
	วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน ครั้งที่ 3 (OPV3)	
	วัคซีนโรคตาครั้งที่ 3 (Rota3)	

อายุ	วัคซีนที่ให้	ข้อแนะนำ
9 เดือน	วัคซีนรวมป้องกันโรค หัด-คางทูม-หัดเยอรมันครั้งที่ 1 (MMR1)	
1 ปี	วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ครั้งที่ 1 (LAJE1)	
1 ปี 6 เดือน	วัคซีนรวมป้องกัน โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนครั้งที่ 4 (DTP4)	
	วัคซีนป้องกันโรค โปลิโอชนิดรับประทานครั้งที่ 4 (OPV4)	
	วัคซีนรวมป้องกันโรค หัด-คางทูม-หัดเยอรมันครั้งที่ 2 (MMR2)	
2 ปี 6 เดือน	วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ครั้งที่ 2 (LAJE2)	
4 ปี	วัคซีนรวมป้องกัน โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนครั้งที่ 5 (DTP5)	
	วัคซีนป้องกันโรค โปลิโอชนิดรับประทานครั้งที่ 5 (OPV5)	

ตารางที่ 2 กำหนดการให้วัคซีนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566

ระดับชั้นเรียน	วัคซีนที่ให้	ข้อแนะนำ
ประถมศึกษาปีที่ 1	วัคซีนรวมป้องกันโรค หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)	เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
	วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (HB)	เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
	วัคซีนป้องกันโรคไข้มองอักเสบเฉฉ ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (LAJE)	เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
	วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV)	เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
	วัคซีนรวมป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก (dT)	เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
	วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ชนิดรับประทาน (OPV)	เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
	วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)	- ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับ เมื่อแรกเกิดและไม่มีแผลเป็น - ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการของ โรคเอดส์
ประถมศึกษาปีที่ 5 (นักเรียนหญิง)	วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จากเชื้อเอชพีวีครั้งที่ 1 (HPV1)	- ระยะห่างระหว่างเข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน
	วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จากเชื้อเอชพีวีครั้งที่ 2 (HPV2)	- กรณีเด็กหญิงไทยที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ให้ฉีดที่ อายุ 11-12 ปี
ประถมศึกษาปีที่ 6	วัคซีนรวมป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก (dT)	

ตารางที่ 3 กำหนดการให้วัคซีนแก่ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนหรือล่าช้าตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566

ครั้งที่	ช่วงอายุ 1-6 ปี		ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป		ข้อแนะนำ
	เดือนที่	วัคซีน	เดือนที่	วัคซีน	
1	0 (เมื่อพบ เด็กครั้งแรก)	DTP-HB-Hib1	0 (เมื่อพบ เด็กครั้งแรก)	dT1	ให้วัคซีน IPV เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ ในเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี และเด็กนักเรียนชั้น ป.๑
		OPV1		OPV1	
		IPV		IPV	
		MMR1		MMR	
		BCG		BCG	- ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรก เกิดและไม่มีแผลเป็น - ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการของโรคเอดส์
2	1	DTP-HB-Hib2	1	HB1	
		OPV2		LAJE1	
		LAJE1			
3	2	MMR2	2	dT2	
				OPV2	
				HB2	
4	4	DTP-HB-Hib3	7	HB3	
		OPV3			
5	12	DTP4	12	dT3	
		OPV4		OPV3	
		LAJE 2		LAJE 2	

ตารางที่ 4 กำหนดการให้วัคซีนในผู้ใหญ่ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566⁴

วัคซีน	กลุ่มเป้าหมาย	กำหนดการให้วัคซีน
dT	หญิงตั้งครรภ์	3 ครั้ง หรือตามประวัติการได้รับวัคซีน
	บุคคลอายุ 20,30,40...ปี (อายุลงท้ายด้วยเลข 0)	1 ครั้ง ทุก 10 ปี
Influenza	หญิงตั้งครรภ์ (สามารถรับวัคซีนได้ตลอดทั้งปี)	1 ครั้ง ทุกการตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป)
	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ปีละ 1 ครั้ง
	เฉพาะช่วงรณรงค์ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 6. โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้	ปีละ 1 ครั้ง
MR	นักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1	1 ครั้ง
	เฉพาะช่วงรณรงค์ ผู้ใหญ่อายุ 20 - 40 ปี ได้แก่ 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน 2. บุคลากรทางทหาร/ตำรวจ 3. ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 4. กลุ่มวัยแรงงานในโรงงานและสถานประกอบการ 5. ประชาชนทั่วไป 6. ประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ แรงงานต่างด้าว ผู้ที่อยู่พื้นที่ชายแดน ผู้ลี้ภัย เป็นต้น	1 ครั้ง
HB	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	- 3 ครั้ง (0, 1, 6 เดือน) ในผู้ที่เกิดก่อนปี 2536 - กระตุ้น 1 ครั้ง ในผู้ที่เกิดหลังปี 2536

หมายเหตุ

1. วัคซีนทุกชนิด ถ้าไม่ได้รับตามกำหนด สามารถให้ทันทีเมื่อพบเด็ก
2. สำหรับวัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเด็กมารับวัคซีนครั้งต่อไปล่าช้า สามารถให้วัคซีนครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
3. กรณีพบเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า ให้ติดตามเด็กมารับวัคซีนตามกำหนดให้ครบตามกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี จากนั้นให้วัคซีนต่อเนื่องตามกำหนดการให้วัคซีนปกติ
4. การบริหารจัดการวัคซีน เป็นไปตามจำนวนวัคซีนที่จัดหาได้และจำนวนวัคซีนคงคลังในแต่ละช่วงเวลา

